

国家林业局植物新品种保护办公室初审公告

(第 1404 号)

按照《中华人民共和国植物新品种保护条例》和《中华人民共和国植物新品种保护条例实施细则(林业部分)》的有关规定,现将国家林业局受理并经初步审查合格的植物新品种权申请公开,请申请人按照有关规定于三个月内缴纳审查费。任何人均可对其中不符合条件或不实之处,向国家林业局植物新品种保护办公室提出书面异议请求,并说明理由。

特此公告。

2014 年 6 月 24 日

满园红

所属的种或属: 蔷薇属

培育人: 朱应雄、张应红、张颢、蹇洪英、唐开学、骆礼宾、张婷、张绍宏、陈敏、周宁宁、王其刚

申请人: 云南鑫海汇花业有限公司 云南省农业科学院花卉研究所

申请号: 20140010

申请日: 2014 年 1 月 7 日

说 明: 申请品种‘满园红’为半直立矮丛灌木,单头月季,植株高度 40~80cm,花深红色,花径 6~8cm,花瓣数 24~28 枚,花型阔瓣杯状中花型,重瓣,花瓣圆形,边缘有刻缺,边缘波形中等。萼片延伸程度中等;花梗长度中等,花梗有刺毛,花梗挺拔度弱,花朵下垂;叶片具 5 小叶,叶片大小中等,叶深绿色,叶表面光泽程度中等,顶端叶卵圆形,叶尖渐尖,基部圆形,边缘复锯齿,嫩枝红棕色,嫩叶红棕色,茎秆浅绿色,刺形为细长斜直刺,浅黄色,刺数量中等。生长势强,抗病性较强,可做庭院地被种植。

特异性说明:

申请品种‘满园红’与近似品种‘月月红’比较,在花色、刺形态和颜色等方面具有明显差异,详见下表:

性状	申请品种:‘满园红’	近似品种:‘月月红’
花色	深红色	红色
花瓣颜色	RHS 53A	RHS 61C

	RHS 53C	RHS 67A
	RHS 53C	RHS 59C
	RHS 53D	RHS 61B
刺形	斜直刺	平直刺
刺的颜色	浅黄色	红棕色

申请品种尚未公开销售。

粉玲珑

所属的种或属：蔷薇属

培育人：朱应雄、王其刚、张应红、唐开学、张颢、朱芷汐、邱显钦、蹇洪英、沐海涛、陈敏

申请人：云南鑫海汇花业有限公司 云南省农业科学院花卉研究所

申请号：20140011

申请日：2014 年 1 月 7 日

说 明：申请品种‘粉玲珑’为半直立性矮丛灌木，单头、有 3~6 个侧枝，植株高度 60~120cm，花深粉色，具淡香味，花型为卷瓣杯状中花型，花径 6~8cm，花瓣数 20~27 枚，花瓣圆形，花瓣边缘反卷程度中等，花瓣边缘有刻缺、边缘波形强；萼片延伸程度较强，花梗长度中等、有极少数刺毛；叶片具 5、7 小叶，叶大小较小，叶深绿色，叶表面光泽度较强，顶端小叶卵圆形、叶尖渐尖、基部圆形、叶边缘单锯齿，嫩叶红棕色、嫩枝红棕色；茎杆浅绿色，刺形态弯刺形、黄绿色，刺数量中等，生长势强，抗病性较强，可用作庭院或盆栽种植。

特异性说明：

申请品种‘粉玲珑’与近似品种‘香淡粉’比较，在花色、花瓣、萼片等方面具有明显差异，详见下表：

性状	申请品种：‘粉玲珑’	近似品种：‘香淡粉’
花色	深粉色	淡粉色
花瓣形状	圆形	倒卵圆形
花瓣颜色	里面边缘 RHS 68A	里面边缘 RHS 65B
	里面中央 RHS N77D	里面中央 RHS 65B
	外面边缘 RHS 68B	外面边缘 RHS 69B
	外面中央 RHS 68B	外面中央 RHS 69B
萼片延伸程度	较强	弱

申请品种尚未公开销售。

红玲珑

所属的种或属：蔷薇属

培育人：张颢、朱应雄、唐开学、张应红、李淑斌、张绍宏、晏慧君、骆礼宾、陈敏、张婷、王其刚

申请人：云南鑫海汇花业有限公司 云南省农业科学院花卉研究所

申请号：20140012

申请日：2014 年 1 月 7 日

说 明：申请品种‘红玲珑’为半直立矮丛灌木，单头月季，有 3~6 个侧枝，植株高度 60~120cm，花红色，具淡香味，花径 6~8cm，花瓣数 20~25 枚，花型卷瓣杯状中花型、重瓣，花瓣圆形，边缘反卷程度中等，花瓣边缘有刻缺，边缘波形强。萼片延伸程度中等；花梗长度中等，直立花梗无刺毛；叶片具 5、7 小叶，叶片大小偏小，叶深绿色，叶表面光泽程度较强，顶端小叶卵圆形，叶尖渐尖，基部钝形，边缘单锯齿；嫩枝红棕色，嫩叶红棕色，茎秆浅绿色；刺形态弯刺形、基部较宽，红棕色，刺数量中等；生长势强，抗病性较强，可做庭院或盆栽种植。

特异性说明：

申请品种‘红玲珑’与近似品种‘波塞尼娜’比较，在花瓣形状、颜色，叶边缘锯齿形态、刺形态、颜色等方面具有明显差异，详见下表：

性状	申请品种：‘红玲珑’	近似品种：‘波塞尼娜’
花瓣形状	圆形	倒卵圆形
花瓣颜色	里面边缘 RHS 46B	里面边缘 RHS 53B
	里面中央 RHS 53B	里面中央 RHS 57A
	外面边缘 RHS 53C	外面边缘 RHS 54A
	外面中央 RHS 53C	外面中央 RHS 65A
刺形态	弯刺	斜直刺
刺颜色	红棕色	黄白色

申请品种尚未公开销售。

鹅黄蜜

所属的种或属：蔷薇属

培育人：云南鑫海汇花业有限公司 云南省农业科学院花卉研究所

申请人：唐开学、朱芷汐、周宁宁、蹇洪英、朱应雄、沐海涛、晏慧君、邱显钦、李淑斌、张应红、王其刚

申请号：20140013

申请日：2014 年 1 月 7 日

说 明：申请品种‘鹅黄蜜’为半直立灌木，单头月季无分枝，植株高度 60~120cm，花黄色，花径 7~9cm，花瓣数 25~30 枚，花型高芯卷边大花型，花瓣倒卵圆形，边缘反卷，花瓣边缘有刻缺，花瓣边缘波形；萼片延伸程度中等，花梗长度中等，花梗长度中等，花梗上有极少数的刺毛；叶片 5 小叶，深绿色，叶片光泽度中等；顶端小叶卵圆形，叶尖渐尖，基部钝形，边缘单锯齿，嫩枝红棕色，嫩叶红棕色，茎秆浅绿色；斜直刺，黄绿色，少刺，有少量小刺；

生长势强，抗病性较强，可用作庭院或者盆栽种植。

特异性说明：

申请品种‘鹅黄蜜’与近似品种‘德国金星’比较，在花型、花瓣数量、形状、颜色刺数量等方面具有明显差异，详见下表：

性状	申请品种：‘鹅黄蜜’	近似品种：‘德国金星’
花型	高芯卷边杯状大花型	阔瓣中花型
花瓣数	25~30	10~15
花瓣形状	倒卵圆形	心型
花瓣颜色	里面边缘 RHS 4B	里面边缘 RHS 2A
	里面中央 RHS 4C	里面中央 RHS 2A
	外面边缘 RHS 4C	外面边缘 RHS 2C
	外面中央 RHS 3C	外面中央 RHS 3C
刺	斜直刺 有少量小刺	斜直刺、弯刺 有大量的的小刺

申请品种尚未公开销售。

宁农杞 1 号

所属的种或属：枸杞属

培育人：秦垦、焦恩宁、戴国礼、曹有龙、石志刚 、何军、李彦龙、李云翔、闫亚美、黄婷、张波

申请人：国家枸杞工程技术研究中心

申请号：20140014

申请日：2014 年 1 月 10 日

说明：宁农杞 1 号生长势强，树姿较开张，自然成枝力（3.2 枝/枝），剪接成枝力（2.1 枝/枝），结果枝细长而软（平均枝长：55.7 cm，平均枝基粗度：0.26cm），当年生枝条浅绿色，仅在节间叶簇生的地方具紫色条纹，具少量棘刺，多年生枝棕褐色。当年生叶翠绿色，成熟叶片深绿色，披针形或长椭圆状披针形，一年生枝上叶片常扭曲反折，正反面叶脉清楚。长宽比 3.36。花蕾上部紫色较深，花冠筒裂片圆形，每一裂片上面具明显的三条脉纹，花萼 2 裂；二年生枝花 4~5 朵腋生，当年生新枝花 1~2 朵腋生。果实长椭圆形，果色鲜红，青果具有明显果尖，成熟后不具明显果尖。鲜果平均纵径 2.26 cm，横径 0.97 cm，果肉厚 0.13 cm，千粒重：1017.5g，鲜干比：4.35:1。种子棕黄色，肾形，平均每个果实结籽量：42.0 粒，饱满种子含量为：81.01%。

申请品种与近似品种的特异性状对比表

	宁杞 1 号	宁农杞 1 号
自交亲和性	自交亲和	自交不亲和
枝条梢部	淡紫红色条纹	仅在节间叶簇生的地方具紫色条纹
叶片	叶片平整	一年生枝上叶片常扭曲反折
花冠裂片脉纹数目	一条脉纹	一主两副，三条脉纹
果形	椭圆柱状，具 4~5 条纵棱。	长椭圆形，无果尖。
千粒重	675.3g	1017.5g
果实成熟期	6 月 7 日（银川）	6 月 4 日（银川）

申请品种尚未公开销售。

宁农杞 2 号

所属的种或属：枸杞属

培育人：秦垦、焦恩宁、戴国礼、曹有龙、石志刚、何军、李彦龙、李云翔、闫亚美、黄婷、张波

申请人：国家枸杞工程技术研究中心

申请号：20140015

申请日：2014 年 1 月 10 日

说 明：宁农杞 2 号树势强健，树体紧凑，生殖生长势强，自然成枝力（8.2 枝/枝），剪接成枝力（4.3 枝/枝），结果枝细长而软（平均枝长：48.0 cm，平均枝基粗度：0.32m），嫩枝条青绿色，不具紫色条纹和斑点；多年生枝棕褐色。叶深灰绿色，披针形或长椭圆状披针形，正反面叶脉清楚。长宽比 4.3。花淡紫色，花冠高脚碟状，筒细长，宽约 2mm，长约为花萼的 2 倍；花冠喉部筒状，檐部裂片不向外翻，花萼 2 裂；二年生枝花 4~5 朵腋生，当年生新枝花 1~2 朵腋生。果实长椭圆形，青果腹缝线处，具一条明显纵棱和两道沟槽；成熟果实呈压扁状或三棱形，果实先端突起，具有小的锥状尖头。鲜果平均纵径 2.50 cm，横径 1.10 cm，果肉厚 0.17 cm，千粒重：1119.2g，鲜干比：4.6:1。种子棕黄色，肾形，平均每个果实结籽量：33.4 粒，饱满种子含量为：86.23%。

申请品种与近似品种的特异性状对比表

	宁杞 1 号	宁农杞 2 号
自交亲和性	自交亲和	自交不亲和
枝条梢部	淡紫红色条纹	青绿色，不具紫色条纹和斑点。
果形	椭圆柱状，具 4~5 条纵棱。	青果腹缝线处具一条明显纵棱和两道沟槽；成熟果实呈三棱形。
千粒重	675.3g	1119.2g
果实成熟期	6 月 7 日（银川）	6 月 3 日（银川）

申请品种尚未公开销售。

宁农杞 3 号

所属的种或属：枸杞属

培育人：焦恩宁、秦垦、戴国礼、曹有龙、石志刚、何军、李彦龙、李云翔、闫亚美、黄

婷、张波

申请人：国家枸杞工程技术研究中心

申请号：20140016

申请日：2014 年 1 月 10 日

说明：宁农杞 3 号树势旺盛，树体紧凑，生殖生长势强，自然成枝力（4.3 枝/枝），剪接成枝力（2.8 枝/枝），结果枝长而硬（平均枝长：61.9 cm，平均枝基粗度：0.29m），当生枝条黄绿色，具淡紫色条纹。叶深绿色，叶长椭圆状披针形，正反面叶脉清楚，长宽比 3.92。花冠较大，花冠裂片椭圆形，上面具一条明显的脉纹，背面颜色较浅，具三条明显脉纹；喉部筒状，不向外翻卷。青果果体表面具不规则凸起，成熟果实长圆柱形，顶端平截，具有乳突状突起。鲜果平均纵径 2.33 cm，横径 1.00 cm，果肉厚 0.13 cm，千粒重：1083.7g，鲜干比：4.26:1。种子棕黄色，肾形，平均每个果实结籽量：36.4 粒，饱满种子含量为：83.38%。

申请品种与近似品种的特异性状对比表

	宁杞 1 号	宁农杞 3 号
自交亲和性	自交亲和	自交不亲和
枝条梢部	淡紫红色条纹	当生枝条黄绿色
花冠裂片脉纹数目	一条脉纹	正面一条脉纹，背面一主两副，三条脉纹
果形	椭圆柱状，具 4~5 条纵棱。	青果果体表面具不规则凸起，成熟果实长圆柱形，顶端平截，具有乳突状突起，果体较软。
千粒重	675.3g	1083.7g
果实成熟期	6 月 7 日（银川）	6 月 4 日（银川）

申请品种尚未公开销售。

中峰银速

所属的种或属：卫矛属

培育人：杜林峰

申请人：许昌县中峰园林有限公司

申请号：20140017

申请日：2014 年 1 月 14 日

说明：该申请品种叶对生，卵状至卵状椭圆形，先端长渐尖，基部近圆形，缘有细锯齿，叶柄细长、约为叶片长的 1/3，秋季叶色变红。伞形花序，腋生，有花 3-7 朵，淡绿色。蒴果粉红色，种子淡黄色，有红色假种皮，上端常有小圆口，稍露出种子。有花序但雌雄均不育，整株不结实，叶片卵圆形较圆，叶色浓绿，生长迅速。与近似品种丝绵木相比，申请品种的特异性表现为：

特异性状	结实性	长势、叶色
申请品种	雌雄均不育，整株不结实	生长迅速、叶色浓绿
近似品种	正常结实	长势、叶色一般

申请品种尚未公开销售。

中峰齿玉

所属的种或属：卫矛属

培育人：杜林峰

申请人：许昌县中峰园林有限公司

申请号：20140018

申请日：2014 年 1 月 14 日

说 明：该申请品种叶对生，卵状至卵状椭圆形，先端长渐尖，基部近圆形，缘有细锯齿，叶柄细长、约为叶片长的 1/3，秋季叶色变红。伞形花序，腋生，有花 3-7 朵，淡绿色。蒴果粉红色，种子淡黄色，有红色假种皮，上端常有小圆口，稍露出种子。叶片锯齿甚为明显、整株叶色浓绿，生长快。与近似品种丝绵木相比，申请品种的特性表现为：

特性性状	叶片锯齿	长势、叶色
申请品种	明显	生长快、叶色浓绿
近似品种	没有或极少出现	长势、叶色一般

申请品种尚未公开销售。

中峰红宇

所属的种或属：卫矛属

培育人：杜林峰

申请人：许昌县中峰园林有限公司

申请号：20140019

申请日：2014 年 1 月 14 日

说 明：该申请品种叶对生，卵状至卵状椭圆形，先端长渐尖，基部近圆形，缘有细锯齿，叶柄细长、约为叶片长的 1/3，秋季叶色变红。伞形花序，腋生，有花 3-7 朵，淡绿色。蒴果粉红色，种子淡黄色，有红色假种皮，上端常有小圆口，稍露出种子。春夏早秋三季叶片绿色，晚秋至入冬季节叶片深红色，整株叶片变红达 80%以上。与近似品种丝绵木相比，申请品种的特性表现为：

特性性状	叶片秋色	长势、树形
申请品种	明显，晚秋变色达 80%以上	生长快、树形优美
近似品种	较少出现秋色叶	长势、树形一般

申请品种尚未公开销售。

中峰炫丽

所属的种或属：卫矛属

培育人：杜林峰

申请人：许昌县中峰园林有限公司

申请号：20140020

申请日：2014 年 1 月 14 日

说明：该申请品种叶对生，卵状至卵状椭圆形，先端长渐尖，基部近圆形，缘有细锯齿，叶柄细长、约为叶片长的 1/3，秋季叶色变红。伞形花序，腋生，有花 3~7 朵，淡绿色。蒴果粉红色，种子淡黄色，有红色假种皮，上端有小圆口，稍露出种子。小乔木株型、枝叶茂密、冬季落叶季节部分叶片呈浅红色，生长快、树形优美。与近似品种丝绵木相比，申请品种的特异性表现为：

特异性状	叶片	长势、树形
申请品种	全株叶片呈 S 状扭曲	生长快、树形优美
近似品种	全株叶片正常平展	长势、树形一般

申请品种尚未公开销售。

玫瑰蜜果桑

所属的种或属：桑属

培育人：韩传明、孙蕾、李正阔、王翠香、王家国、张连忠、贾明、王开芳、孙道英

申请人：山东省林业科学研究院 夏津县古榘研究所

申请号：20140021

申请日：2014 年 1 月 15 日

说明：‘玫瑰蜜果桑’属桑科（*Maraceae*）桑属（*Morus* L.）桑树（*Morus alba* L.）。落叶乔木；雌株；树冠紧凑，树型直立，枝条粗长而直，树干灰褐色，皮孔多，圆形，节间短，节间距 3.87 cm，一年生枝银白色；叶三角形，深绿色，叶缘有锯齿，叶尖微尖，叶片较大，中厚，单叶重 3.84 g，叶柄长 4.08 cm，叶长 21.36 cm，叶片宽 13.19 cm，叶片长宽比 1.6。二年以上枝叶片较小，单叶重 1.52g，叶柄长 3.89 cm，叶片长 15.73 cm，叶片宽 7.83 cm，叶片长宽比 2.02。

雌花序花芽率高，达 98.45%，坐果率 92.89%，单芽果数 3-6 个，平均 4.8 个。果实卵圆形，聚花果，单果重 2.28 g，果纵径 2.0-2.5 cm，平均 2.22 cm，果横径 1.2-1.5 cm，平均 1.45 cm，果柄长平均 0.78 cm，瘦果数 49 粒/穗，黑色柱头脱落，少数宿存，有籽。果实清香蜂蜜味，果汁鲜艳，汁多，果实成熟期颜色由绿变白再变粉紫，有机酸 1.06%，Vc10.99 mg/100g，可溶性固形物 23-31%，PH 值 6.22，水分含量 74.9%。

品种特异性：‘玫瑰蜜果桑’与普通白榘比较性状差异如下：

品种	果实成熟期	果实味道	果实颜色
玫瑰蜜果桑	5 月中旬	清香蜂蜜味	粉紫色
白榘	5 月下旬	甘甜	白色

申请品种尚未公开销售。

玫瑰香果桑

所属的种或属：桑属

培育人：孙蕾、韩传明、李正阔、王家国、王翠香、张连忠、赵登超、王小芳、宋翠环

申请人：山东省林业科学研究院 夏津县古榘研究所

申请号：20140022

申请日：2014 年 1 月 15 日

说明：‘玫瑰香果桑’属桑科（*Maraceae*）桑属（*Morus* L.）桑树（*Morus alba* L.）。落叶乔木；雌株；树冠紧凑，树型直立，枝条粗长而直，树干灰褐色，皮孔多，圆形，节间短，节间距 3.87 cm，一年生枝银白色；叶三角形，深绿色，叶缘有锯齿，叶尖微尖，叶片较大，中厚，单叶重 3.85 g，叶柄长 4.52 cm，叶片长 22.3 cm，叶片宽 13.21 cm，叶片长宽比 1.7。二年以上枝叶片较小，单叶重 1.54 g，叶柄长 3.84 cm，叶片长 16.1cm，叶片宽 7.76 cm，叶片长宽比 2.06。雌花序花芽率高，达 98.15 %，坐果率 91.89 %，单芽果数 3-8 个，平均 5.3 个。果实卵圆形，聚花果，单果重 2.02 g，果纵径 2.0-2.5 cm，平均 2.03 cm，果横径 1.2-1.5 cm，平均 1.34 cm，果柄长平均 0.77 cm，瘦果数 46 粒/穗，黑色柱头脱落，少数宿存，有籽。果实具玫瑰清香味，果汁鲜艳，汁多，果实成熟期颜色由绿变白再变浅紫色，有机酸 1.03 %，Vc 11.88mg/100g，可溶性固形物 23-30 %，PH 值 6.17，水分含量 74.67 %，硬度较大，果皮较厚不易破损，耐运输。

品种特异性：‘玫瑰香果桑’与普通白椹比较性状差异如下：

品种	果实成熟期	果实味道	果实硬度	果实颜色
玫瑰香果桑	5 月中旬	玫瑰清香味	较大	浅紫色
白椹	5 月下旬	甘甜	较小	白色

申请品种尚未公开销售。

中科紫金 1 号

所属的种或属：紫金牛属

培育人：刘华、宁祖林、曾振新、杨镇明、陈玲

申请人：中国科学院华南植物园

申请号：20140023

申请日：2014 年 1 月 15 日

说明：‘中科紫金 1 号’为丛生植物，终年常绿，枝繁叶茂，耐荫性好。株高 20-30 厘米。具匍匐根状茎，茎圆柱形，分枝多，茎长可达 50 厘米以上。嫩茎绿色，密被棕色鳞片，老茎无鳞片。叶片正背面颜色为深绿色，互生，倒披针形，先端钝或钝急尖，基部楔形，长 2-3 厘米，宽 1-2 厘米。叶全缘或叶中部以上具不明显波状齿。伞形花序腋生或侧生茎节上，每花序具花 3-5 朵，花最大宽幅 1 厘米左右，花瓣 5 片，白色。果球形，由红变黑色，直径 0.5-0.7 厘米，无毛，无腺点。花期 4 月上旬至 6 月下旬，果期 5 月下旬至翌年 1 月中旬。

2、申请品种与近似品种比较的主要不同点如下：

形状/品种	中科紫金 1 号	小紫金牛
叶形	倒披针形， 叶小（长 2-3cm, 宽 1-2cm）	倒卵形， 叶大（长 4-7cm, 宽 2-3cm）
叶色	深绿	浅绿
茎	茎细，分枝多，着叶多	茎粗，分枝少，着叶少

申请品种尚未公开销售。

钟山红

所属的种或属：槭属

培育人：唐玲，李倩中，李淑顺，荣立苹

申请人：江苏省农业科学院

申请号：20140024

申请日：2014 年 1 月 20 日

说 明：申请品种基本植物学特征描述：落叶乔木，单叶对生，叶纸质，深 5 裂，叶片外貌圆形或椭圆。生长季成熟叶上表面深绿色，下表面淡绿色。花期 4 月，花多数常成顶生，伞房花序。果期 8 月，翅果黄褐色，张开成钝角。秋季 10 月下旬叶片开始变色，11 月上旬叶片转为鲜红色，进入最佳观赏期，比普通青枫提前 20 天左右；11 月下旬落叶。

与相似品种对比的不同点：

主要特性	钟山红	普通青枫
叶片转色期	10 月下旬	11 月中旬
转色后叶色	紫红色	黄色或红色
嫩叶叶色	紫红色	橙红色

申请品种尚未公开销售。

朝霞杨

所属的种或属：杨属

培育人：黄印冉、王玉忠、张均营、姜群僧、贾宗锴、徐振华、闫淑芳

申请人：河北省林业科学研究院 河间市紫金红杨苗木种植专业合作社

申请号：20140025

申请日：2014 年 1 月 25 日

说 明：特异性：申请品种‘朝霞杨’系欧美杨 107 杨的伐桩萌蘖变异品种。该品种苗干通直，树冠窄，春季叶片呈紫红色，夏季叶片转为褐红色，秋季至落叶前叶色转为红色，叶片较欧美杨 107 杨略小，叶芽较欧美杨 107 杨小，落叶时间比欧美 107 期较晚。

申请品种与近似品种比较的主要不同点如下：

性状 品种	叶片颜色	叶芽大小
朝霞杨	春季为紫红色，夏季为褐红色，秋季为红色。	较小
欧美杨 107 杨	春、夏和初秋为绿色，落叶前短期为黄色。	较大

申请品种尚未公开销售。

珍珠柿

所属的种或属：柿

培育人：张帆、耿洪波、孟艳艳、公维明

申请人：山东瀚景园林植物新品种研发有限公司

申请号：20140026

申请日：2014 年 2 月 8 日

说明：落叶乔木，高 4-6 米。树皮灰黑色，方块状开裂；主干抽枝多；单叶互生，叶片长椭圆形、倒卵状椭圆形，近革质，长 6-18cm，上表面光滑绿色，下表面沿主脉常被毛；花单性同株，雄花序多有 1-3 花组成，雌花单生，花冠黄白色；浆果肉质，花萼宿存，成熟果实橙红色，个头比一般柿子小，直径 3-4cm，结实率高，挂果时间长，从当年 10 月成熟至来年 4 月不落。

(2) 品种特异性

珍珠柿与对照普通柿树比较性状差异如下：

品种及对照	果实大小	挂果时间	果实口感
珍珠柿	小，直径在 3-4cm	长，从当年 10 月成熟至来年 4 月不落	成熟即可食用
柿树	中等，直径在 8-10cm	冬季全部脱落	成熟时有涩味

申请品种尚未公开销售。

抱头槐

所属的种或属：槐属

培育人：张帆、李金胜、孟艳艳、公维明

申请人：山东万路达园林科技有限公司 东营菁华现代林业发展有限公司

申请号：20140027

申请日：2014 年 2 月 8 日

说明：落叶乔木，高 8-12 米。主干抽枝多（7-12 条），主枝分枝角度小，仅 30-40°，树冠纺锤形，直立紧凑，生长势强；主干灰黑色，较光滑，树皮横向块状浅裂；嫩枝翠绿色，复叶长 20cm，小叶 13 枚；小叶椭圆形，长 2cm，宽 2.5cm。

(2) 品种特异性

‘抱头槐’与近似品种‘抱印槐’比较性状差异如下：

品种及对照	植株分枝性状	树冠形状	树皮开裂方式	叶片形状
抱头槐	主干分枝多（7-12 条）	树冠纺锤形，直立紧凑。	横向块状浅裂	长椭圆形
抱印槐	主干分枝少（3-7 条）	树冠长椭圆形，开张。	深纵裂。	长卵形

申请品种尚未公开销售。

夏红

所属的种或属：李属

培育人：李玉娟 张健 高捍东 李敏 谈峰 王莹 陈惠 冒洪波

申请人：江苏沿江地区农业科学研究所 南京林业大学

申请号：20140028

申请日：2014 年 2 月 11 日

说明：落叶小乔木，树冠球形。新枝紫红色，老枝灰褐色，枝条粗壮。新叶常年表现为叶面、叶背同为鲜紫红；生长期 270 天左右，红叶期为 250 天左右。“夏红”3 月上中旬新芽萌

动，叶芽、花芽紫红；3月中下旬花叶同放。花簇生1-5朵，花冠径约为1.8cm，花瓣近圆形5片，粉色。具花萼3-4个，红色，长约0.42cm。花柄初花约0.6cm，盛花期为1.6cm，青紫色。雄蕊约30枚，近平于花瓣，柱头高于花瓣。花托紫色。个别重瓣，重瓣的柱头、花蕊、花托也加倍。成熟叶紫色，叶背鲜红色，叶片长7-9.5cm，宽4.5-5.5cm，叶基楔形，叶边缘锯齿为密重锯齿，叶柄暗紫色，长1.2cm。生长期始终有新叶萌发，夏季成熟叶片返青现象较轻。

品种特异性：花艳，夏季鲜亮，落叶晚。

品种	花期	落叶终期	花色	果	整株表现
中华红叶李	3月上旬	12月上旬	浅粉色	红色	暗紫偏青
“夏红”	3月中下旬	12月下旬	粉色	紫色	鲜紫红

申请品种尚未公开销售。

海柳 1 号

所属的种或属：柳属
培育人：张健 李敏 李玉娟 王莹 谈峰 丛小丽
申请人：江苏沿江地区农业科学研究所
申请号：20140029
申请日：2014 年 2 月 11 日

说 明：落叶乔木，树干通直，主干树皮灰褐色稍纵裂。新枝红褐色，老枝灰紫色。花期 4 月上旬，顶端优势明显，腋芽萌发力强，分枝较早，侧枝与主干夹角 45-60°。树冠塔形，分枝均匀。叶披针形，单叶互生，叶片长达 5-14cm，宽 1.5-3.0cm，比竹柳窄但比旱柳宽，先端长渐尖，基部楔形，边缘有明显的细锯齿，叶片正面绿色，上覆少量白色柔毛，背面发白，叶柄微红、较长。耐盐碱、可在含盐量 0.4%盐碱地里直插生根，耐水淹，适应性广。速生性强，当年扦插苗生长高度在 3 米以上。

品种特异性：树皮灰褐色稍纵裂；分枝开阔，侧枝与主干夹角 45-60 度；新枝红褐色，老枝灰紫色；叶片长 5-14cm，宽 1.5-3.0cm，比旱柳的叶片宽大，叶柄微红较长；顶端优势明显，腋芽萌发力极强，分枝较早；在江苏境内一般 2 月下旬萌芽，3 月中旬放叶，4 月上旬开花， 11 月中下旬落叶；耐盐碱，可在含盐量 0.4%盐碱地里直插生根。（见附页）

性状/品种	海柳 1 号	竹柳	旱柳
主干	树皮灰褐色稍纵裂	树皮深绿色，较光滑	树皮灰褐色，深纵裂
主干与侧枝夹角	45-60°	30-45°	40-50°
枝条颜色	新枝红褐色，老枝灰紫色	新枝黄绿色，老枝绿色	绿色

叶片大小	长 5-14cm，宽 1.5-3.0cm	长 15-22cm，宽 3.5-6.2cm	长 4-10cm，宽 1-1.5cm
叶柄	微红，较长	微红，较短	绿色，较长
物候期	2 月下旬萌芽，3 月中旬放叶，4 月上旬开花，落叶期 11 月中旬。	3 月上旬萌芽，3 月中下旬放叶，花期 4 月上中旬，落叶期 11 月下旬。	2 月下旬萌芽，3 月中旬放叶，花期 3 月下旬，落叶期 11 月下旬。
耐盐能力	0.4%	0.3%	0.1%

申请品种尚未公开销售。

渤海柳 4 号

所属的种或属：柳属

培育人：刘德玺、焦传礼、刘国兴、刘桂民、魏海霞、周建、白云祥、杨欢

申请人：滨州市一逸林业有限公司 山东省林业科学研究院

申请号：20140030

申请日：2014 年 2 月 17 日

说 明：落叶乔木，雄株，主干直立，顶端优势极为明显，自然接干能力强。枝条斜上伸展，不下垂，侧枝分布均匀，生长季节枝条黄绿色，冬季枝条黄色，分枝角度中等。叶片阔披针形，叶柄短。叶片平均长 9.8cm，宽 1.6cm，叶柄长 0.8cm，叶缘细锯齿状。枝条在立秋后逐步变色，颜色随着天气变冷加深，由黄绿色到落叶时变成黄色。

在山东滨州地区物候期（2013 年）：芽膨大期 3 月上旬，萌芽期 3 月 20 日，展叶期 3 月 29 日至 4 月 8 日，叶色始变期 11 月 8 日，落叶末期 12 月 20 日。

品种特异性：‘渤海柳 4 号’与‘盐柳一号’性状差异如下：

品种	枝条	叶片形状	叶柄长度
渤海柳 4 号	斜上伸展	阔披针形	较短
盐柳一号	下垂	长披针形	较长

申请品种尚未公开销售。

渤海柳 5 号

所属的种或属：柳属

培育人：焦传礼、刘德玺、王振猛、刘桂民、王莉莉、党东雨、杨欢、焦世铭

申请人：滨州市一逸林业有限公司 山东省林业科学研究院

申请号：20140031

申请日：2014 年 2 月 17 日

说 明：落叶乔木，雄株。主干直立性强，顶端优势明显。一年生苗枝条不下垂，侧枝分布均匀，定植两年的枝条下垂，但顶梢仍直立，叶片长披针形，细长，宽度较窄，平均长 14.3cm，宽 1.3cm，叶柄长 1.2cm。树干叶痕明显，有纵向裂纹。

在山东滨州地区物候期（2013 年）：芽膨大期 3 月上旬，萌芽期 3 月 24 日，展叶期 3 月 26 日至 4 月 7 日，叶色始变期 11 月 10 日，落叶末期 11 月 26 日。

品种特异性：渤海柳 5 号与对照品种比较性状差异如下：

品种	叶片宽度	顶梢	枝条节间长度
渤海柳 5 号	较窄	直立	较短
大明湖垂柳	较宽	半下垂	较长

申请品种尚未公开销售。

渤海柳 6 号

所属的种或属：柳属

培育人：焦传礼、刘德玺、杨庆山、李永涛、王霞、焦世铭、杨光

申请人：滨州市一逸林业有限公司 山东省林业科学研究院

申请号：20140032

申请日：2014 年 2 月 17 日

说 明：落叶乔木，雄株。干性强，顶端优势明显，速生，枝条节间短，腋芽饱满、较大，冬季黑色，叶片长披针形，先端弯曲；叶片平均长 12.3 厘米，平均宽 1.3 厘米，叶柄较短，叶柄平均长 0.7 厘米，叶尾部弯曲。2 年生树皮粗糙、纵裂。

在山东滨州地区物候期（2013 年）：芽膨大期 3 月上旬，萌芽期 3 月 20 日，展叶期 3 月 26 日至 4 月 4 日，叶色始变期 11 月 1 日，落叶末期 11 月 27 日。

品种特异性：渤海柳 6 号与对照品种比较性状差异如下：

品种	性别	腋芽	叶片先端	叶柄长度
渤海柳 6 号	雄株	饱满较大、冬季黑色	弯曲	较短
大明湖垂柳	雌株	饱满度中等	直伸	较长

申请品种尚未公开销售。

渤海柳 7 号

所属的种或属：柳属

培育人：焦传礼、刘德玺、党东雨、杨庆山、王振猛、周建、白云祥、杨光

申请人：滨州市一逸林业有限公司 山东省林业科学研究院

申请号：20140033

申请日：2014 年 2 月 17 日

说 明：落叶乔木，雌性。主干明显，生长快，三年生树干青绿色，枝条细长，节间长。叶片长披针形，叶片平均长 14.1 厘米，叶片宽平均 1.3 厘米，叶柄扭曲，平均长 1.3 厘米，托叶较大，存留时间长，同时表现出耐盐碱，耐瘠薄等优良性状。

在山东滨州地区物候期（2013 年）：芽膨大期 3 月上旬，萌芽期 3 月 20 日，展叶期 3 月 24 日至 4 月 2 日，叶色始变期 11 月 8 日，落叶末期 11 月 26 日。

品种特异性：渤海柳 7 号与对照品种比较性状差异如下：

品种	3 年生树干皮	枝条垂度	枝条粗度	托叶
渤海柳 7 号	绿色	大	细长	存留时间长
大明湖垂柳	开裂，土黄色	中等	粗壮	存留时间短

申请品种尚未公开销售。

绿蕾一号金银花

所属的种或属：忍冬属

培育人：李碧芳、苏志坚、陈梦海、陈海婴、叶慧娟

申请人：大田县自然源药材种植有限公司

申请号：20140034

申请日：2014 年 2 月 25 日

说明：绿蕾一号金银花植株生长旺盛，枝条节间短，株形直立性强，花枝顶端生有 10-18 个花蕾，叶片薄，革质，卵形至矩卵形，叶片背毛多而密，花冠顶端有粗短毛，主根深，根系发达，对土壤气候适应性强，生长速度快，开花早，花期长，产量高，一年多次开花。

绿蕾一号金银与相似品种（大毛花）比较

绿蕾一号金银花(申请的植物新品种)	大毛花（母本）
枝条节间短	枝条长、节间长
株形直立性强	株型矮而松散
花枝顶端生有 10-18 个花蕾	花枝顶端不生花蕾
花蕾长度 4~6cm	花蕾长度 3~5cm
叶片薄，革质，卵形至矩卵形，叶片背毛多而密	叶肥大，呈椭圆形，密背长柔毛，花叶长且大
亩产干花 120 斤到 200 斤之间	亩产干花 78 斤到 130 斤之间
绿原酸含量 2.9%、木樨草甘含量 0.051% （2010 年《中国药典》检测标准：绿原酸含量 1.5%、木樨草甘含量 0.050%）	绿原酸含量 2.3%、木樨草甘含量 0.10% （2005 年《中国药典》检测标准：绿原酸含量 1.5%、木樨草甘含量 0.100%）

申请品种尚未公开销售。

千叶香

所属的种或属：樟属

培育人：罗忠生、彭招兰、龙光远、蒋志茵、黄逢龙、郭逸榴、吴茂隆、李燕山

申请人：吉安市林业科学研究所

申请号：20140035

申请日：2014 年 2 月 25 日

说明：申请品种为黄樟中富含右旋芳樟醇的特异化学类型，叶具有芳樟醇特有香气，其它类型的黄樟中不具有芳樟醇气味（有樟脑、柑、姜等气味），它与“芳樟”比较的主要不同点如下：

品种		千叶香	芳樟
分类地位		黄樟 <i>Cinnamomum porrectum</i>	樟 <i>C. camphora</i>
外观形态	叶形及大小	椭圆状卵形或长椭圆状卵形，长 6~16cm，宽 3~8cm	卵形或卵状椭圆形，边缘微波状，长 6~12cm，宽 2.5~5.5cm
	叶脉	羽状脉，侧脉 4-5 对，脉腋无腺窝	多近离基三出脉，脉腋有明显的腺窝
	花被裂片	宽长椭圆形，具点，先端钝形	椭圆形，无腺点，果时花被片脱落
	果托	狭长倒锥形	杯状，顶端平截
	果期	6~9 月	10~11 月
其他特征说明		叶具芳樟醇特有香气，提取叶油测定主成分为右旋芳樟醇	叶具芳樟醇特有香气，提取叶油测定主成分为左旋芳樟醇

申请品种尚未公开销售。

晋栎 2 号

所属的种或属：栎树属

培育人：安新民、王国栋、陈 仲、胡 伟、赵志强 、王宏英 、王佳佳、薛 莎、李 敏

申请人：北京林业大学 襄垣县国栋园林花木种植专业合作社

申请号：20140036

申请日：2014 年 2 月 27 日

说 明：该品种为落叶乔木，多分枝，奇数羽状复叶互生，卵形或卵状椭圆形，有不规则粗齿或羽状深裂，有时部分小叶深裂为不完全的二回羽状复叶。叶色四月初出芽呈玫红色，五月份由红里带黄变为黄里带红，8 月份变为金黄色至 11 月霜冻叶落，叶片小而密集，节间短，叶茎呈 90°平行，圆锥花序顶生、花小、黄色、中心红色，宽而疏散，花期七月，硕果三角状卵形，顶端尖，果期八至九月。该品种为锦叶栎种子实生选优，与栎树相比，栎树叶色深绿，与锦叶栎相比，锦叶栎春夏秋三季均为金黄色，而新品种则四月初出芽呈玫红色，五月份由红里带黄变为黄里带红，8 月份变为金黄色至 11 月霜冻叶落，叶片小而密集，节间短，叶茎呈 90° 平行。

特异性：晋栎 2 号与其它栎树品种比较性状差异如下

品种	叶片颜色	叶片大小	嫩茎颜色
晋栎 2 号	依次由玫红、黄红、金黄渐变	小	红色
栎树	深绿色	大	绿黄色
锦叶栎	金黄色	较大	红色
晋栎 1 号	依由红或橙红、黄、黄绿渐变	大	红色
晋栎 3 号	依次由玫红、红黄、黄红、金黄、黄绿渐变	较大	红色

申请品种尚未公开销售。

晋栎 3 号

所属的种或属：栎树属

培育人：王国栋、安新民、高凯、梁风兰、常丽娟、王华帅、曾庆宇、郭文斌、赵庆华

申请人：北京林业大学 襄垣县国栋园林花木种植专业合作社

申请号：20140037

申请日：2014 年 2 月 27 日

说 明：该品种为落叶乔木，多分枝，奇数羽状复叶互生，卵形或卵状椭圆形，有不规则粗齿或羽状深裂，有时部分小叶深裂为不完全的二回羽状复叶。四月份出芽展叶为玫红色，五月份为红里带黄，六月份为黄里带红，七月份为金黄色，八月中旬变为黄绿色，直至叶落，叶片小而疏松，叶脉呈 45°角。节间比晋栎 1 号短，比晋栎 2 号长，小枝发育没有晋栎 1 号粗壮，栎树全年叶色为深绿色，锦叶栎三季

叶色金黄，晋栾 1 号叶色三季四变，晋栾 3 号叶色三季五变。该品种是 2007 年从锦叶栾出圃地边缘由锦叶栾落地种子自然萌生，也是第一棵由锦叶栾种子繁育出的实生苗，经三年观察，无论树形、长势、叶色变化均与其它同类品种有很大差异。

特异性：晋栾 3 号与其它栾树品种比较性状差异如下

品种	叶片颜色	叶片大小	嫩茎颜色
晋栾 3 号	依次由玫红、红黄、黄红、金黄、黄绿渐变	较大	红色
栾树	深绿色	大	绿黄色
锦叶栾	金黄色	较大	红色
晋栾 1 号	依由红或橙红、黄、黄绿渐变	大	红色
晋栾 2 号	依次由玫红、黄红、金黄渐变	小	红色

申请品种尚未公开销售。

春韵含笑

所属的种或属：含笑属

培育人：曹基武、刘春林、郭超

申请人：中南林业科技大学

申请号：20140038

申请日：2014 年 3 月 14 日

说 明：植物特征描述：常绿乔木，树形呈塔形；小枝绿色，老枝灰绿色；芽、叶背面、叶脉、叶柄及嫩枝密被棕褐色毛。上面深绿色，下面灰绿色；花期 1~3 月，单花花期 5~6 d；该品种与父母本阔瓣含笑与深山含笑比较的不同点为：

性状	春韵含笑	阔瓣含笑（母本）	深山含笑（父本）
叶质地	厚革质	薄革质	革质
叶色	叶背灰绿色被棕褐色短柔毛	叶背灰白色被褐色微柔毛	叶背叶面无毛被白粉
叶形状	椭圆形或长椭圆形	椭圆形或倒卵状椭圆形	长圆状椭圆形
叶片大小	长 9.5-13.5 cm，宽 3.5-5.5 cm，先端急尖	长 18-21 cm，宽 5-7 cm，先端渐尖或骤狭短渐尖	长 11-15 cm，宽 4.5-7.5 cm，先端骤狭短渐尖或短渐尖而尖头钝
花形	张开呈杯状	张开呈荷花状	完全张开呈荷花状
花被片	9 片，米黄色，倒卵形至倒卵状椭圆形	9 片，白色，倒卵状椭圆形	9（10）片，纯白色倒卵形，基部稍带淡红色
花径	4-6cm	5-7.5cm	6-8cm
雄蕊颜色	淡紫色	黄褐色	黄白色
花期	1-3 月	2-3 月	1-3 月
结实	未见结实	9-10 月，结实少	10-11 月，结实多
生长速度	稍慢	中等	较快

申请品种尚未公开销售。

瑞斯 1708a (ruice1708a)

所属的种或属：蔷薇属

培育人：汉克.德.格罗特 (H.C.A. de Groot)

申请人：迪瑞特知识产权公司 (De Ruiter Intellectual Property B.V.)

申请号：20140039

申请日：2014 年 3 月 18 日

说 明：申请品种瑞斯 1708a (ruice1708a) 属于温室栽培的多头切花品种；株形紧凑，茎秆直立生长；茎秆高度为矮，嫩枝花青素着色为弱，主枝皮刺数量为多；叶片大小为中到大、光泽为中；小叶叶缘波状为弱、顶端小叶形状为卵形、叶基部形状为尖锐、尖部形状为锐尖；花型为重瓣，花瓣数为少；花形状为不规则圆形，花径为小；花香为无；萼片延伸为弱到中，花色属红混合色系，花瓣形状为倒椭圆形、内侧主要颜色有 2 种，主要颜色为红色，在 RHS41A 和 41B 之间，第二种颜色为黄色 RHS07A，花瓣外侧主要颜色为 RHS 12B；雄蕊花丝颜色为橙色。

近似品种瑞克德 2057a (ruicd2057a) 属于温室栽培的多头切花品种；株形紧凑，茎秆直立生长；茎秆高度为矮到中；主枝皮刺数量为中；叶片大小为极大、光泽为强；花径为小到中；萼片延伸为中，花色属红色系，花瓣形状为椭圆形、内侧主要颜色为 RHS 43A 和 44A 之间，雄蕊花丝颜色为粉色。

申请品种与其近似品种相比，主要不同点如下：

品种/性状	瑞斯 1708a (ruice1708a)	瑞克德 2057a (ruicd2057a)
茎秆高度	矮	矮到中
主枝皮刺数量	多	中
叶片大小	中到大	极大
叶片光泽	中	强
花茎	小	小到中
花瓣内侧主要颜色	有 2 种，主要颜色为红色，在 RHS41A 和 41B 之间，第二种颜色为黄色 RHS07A	RHS 43A 和 44A
花瓣外面主要颜色	RHS 12B	RHS 43A 和 44A
雄蕊花丝颜色	橙色	粉色

申请品种尚未公开销售。

金彩雀

所属的种或属：厚皮香属

培育人：江胜德、项智能

申请人：浙江虹越花卉股份有限公司

申请号：20140040

申请日：2014 年 3 月 24 日

说 明：灌木或小乔木，全株无毛；树皮灰褐色，平滑；嫩枝浅红褐色或灰褐色，小枝灰

褐色。叶革质或薄革质，通常聚生于枝端，呈假轮生状，椭圆形、椭圆状倒卵形至长圆状倒卵形，边全缘，上面深绿或绿色，有光泽，下面浅绿色，全叶间有金黄色变色，显目；中脉在上面稍凹下，在下面隆起。花两性或单性，两性花：小苞片2，三角形或三角状卵形，顶端尖，边缘具腺状齿突；花瓣5，淡黄白色，倒卵形，顶端圆。果实圆球形，成熟时肉质假种皮红色。

近似品种选其亲本原种厚皮香（*Ternstroemia gymnanthera*），特异性：

特异性状	叶色	叶缘
申请品种	金黄间有绿色条纹	深黄色
近似品种	暗绿、斑点杂色	绿色

申请品种尚未公开销售。

金珊瑚

所属的种或属：绣球属

培育人：江胜德、项智能

申请人：浙江虹越花卉股份有限公司

申请号：20140041

申请日：2014年3月24日

说明：落叶小灌木，枝条开展，冬芽裸露。叶对生，卵形至卵状椭圆形，表面暗绿色，背面被有星状短柔毛，叶缘有锯齿，叶色灰绿，大片黄色斑块、条纹散布其中。春夏季开花，花于枝顶集成大球状聚伞花序，边缘具白色中性花。花瓣4~5片，小形。自然花期4-5月，花径18-20厘米，全部为不孕花。花初开带绿色，后转为白色，具清香。叶具短柄，对生，叶片肥厚，光滑，椭圆形或宽卵形，先端锐尖，长10~25公分，宽5~10公分，边缘有粗锯齿。

近似品种选择其亲本品种（代号 HYYXQ-1），二者的特异性为：

特异性状	叶色	斑块
申请品种	灰绿	大片、黄色，条纹散布其中
近似品种	深绿	无

申请品种尚未公开销售。

JFS-秋辰(JFS-Autumn Fest)

所属的种或属：槭属

培育人：基思·沃伦（Keith S. Warren）

申请人：杰·弗兰克·施密特父子有限公司（J. Frank Schmidt & Son Co.）

申请号：20140042

申请日：2014年3月17日

说明：申请品种“JFS-秋辰”（JFS-Autumn Fest）15~20年生树形为窄锥体至窄椭圆形，2年生苗木分枝角度中度狭窄，为40°~50°；分枝向上弯曲至30°~40°，叶片上表面略微光滑。

“JFS-秋辰”（JFS-Autumn Fest）的形态特征与糖槭品种“Green Mountain”相似。其形态

差异在于：

	特 征	“JFS-秋辰” (JFS-Autumn Fest)	“Green Mountain”
1	2年生苗木分枝角度	中度狭窄，40°～50°	宽，50°～80°
2	2年生苗木分枝弯曲度	窄，向上弯曲，30°～40°	较宽，45°～60°
3	15～20年生树木冠形	窄锥体至窄椭圆形	宽椭圆形至圆形
4	叶片上表面光泽度	略微光滑	黯哑，革质

在中国境内的第一次销售时间是 2013 年 3 月 19 日，销售地为青岛；

在中国以外地区的第一次销售时间是 2010 年 4 月 17 日，销售地为美国。

JFS-绛日 (JFS-Crimson Sunset)

所属的种或属：槭属

培育人：基思·沃伦 (Keith S. Warren)

申请人：杰·弗兰克·施密特父子有限公司 (J. Frank Schmidt & Son Co.)

申请号：20140043

申请日：2014 年 3 月 19 日

说 明：申请品种“JFS-绛日”(JFS-Crimson Sunset) 为杂交品种，夏叶为紫色；而其亲本夏叶为典型的绿色。该品种给树冠直立椭圆形，枝叶密集并略紧凑；树干强壮、通直；树皮质地 8 年生以内平滑，随年龄增长出现轻微粗糙和纵裂；皮孔灰棕色 (164D 至 165C)，圆形至椭圆形。头三年内，树枝颜色随时间变化由灰紫色 (187A)，随季节变为灰橙色 (187A 和 174B)。叶片质地平滑，有光泽，且边缘平滑；主要叶片尖端锐利，其他带尖；基底为截形或近心形；春季初长叶为灰紫色 (187A)；夏叶颜色：上部叶片正面灰紫色 (187A)，中部略带黄绿色 (147A)；下部为灰紫色 (183A)。

特性：“JFS-绛日”(JFS-Crimson Sunset) 夏叶呈现特别的深紫色，且树冠较为紧凑，枝条近于直立生长，耐热性较亲本有所提高。与最为相似的挪威槭品种‘Crimson King’相比，有以下差异。

特 征	JFS-绛日 (JFS-Crimson Sunset)	‘Crimson King’
1 年生苗高	短，231 cm	更高，267 cm
节间长度	短，7.8 cm	更长，12 cm
一年生苗的叶缘	平滑	波浪状
耐热性	耐热，生长良好	不耐热，生长不良

在中国境内的第一次销售时间是 2013 年 3 月 23 日，销售地为青岛；

在中国以外地区的第一次销售时间是 2009 年 2 月 5 日，销售地区为美国。

湘虹

所属的种或属：楠属

培育人：颜立红、蒋利媛、向光锋、田晓明

申请人：湖南省森林植物园

申请号：20140044

申请日：2014 年 3 月 27 日

说 明：该品种为常绿小乔木。叶革质，披针形或倒披针形，长 7~13 cm，宽 2~3(4) cm，先端渐尖或长渐尖，基部渐狭或楔形，上面发亮，下面有短柔毛，脉上被伸展长柔毛，有时具缘毛，中脉上面下陷，侧脉每边 10~14 条，上面平坦或下陷，下面突起，横脉及小脉多而密，在下面结成十分明显的网格状；叶柄长 5~11(20) mm。新发出的嫩叶叶片上有淡红色或紫红色条纹，嫩叶叶柄淡红色，嫩枝紫红色或淡红色，老叶上有可见斑纹。

相似品种比较最主要的几个不同点。

品种名称	嫩叶	嫩叶叶柄	嫩枝
湘虹	淡红色、红色条纹	淡红色	紫红色或淡红色
闽楠	绿色	绿色	绿色

申请品种尚未公开销售。

湘云

所属的种或属：楠属

培育人：颜立红、蒋利媛、向光锋、田晓明

申请人：湖南省森林植物园

申请号：20140045

申请日：2014 年 3 月 27 日

说 明：该品种为常绿小乔木。叶革质，披针形或倒披针形，长 7~13 cm，宽 2~3(4) cm，先端渐尖或长渐尖，基部渐狭或楔形，上面发亮，下面有短柔毛，脉上被伸展长柔毛，有时具缘毛，中脉上面下陷，侧脉每边 10~14 条，上面平坦或下陷，下面突起，横脉及小脉多而密，在下面结成十分明显的网格状；叶柄长 5~11(20) mm。新发出的嫩叶叶片上有白色条纹或黄白色条纹，嫩叶叶柄淡红色。

相似品种比较最主要的几个不同点。

品种名称	嫩叶	嫩叶叶柄
湘云	白色、黄白色条纹	淡红色
闽楠	绿色	绿色

申请品种尚未公开销售。

冬韵

所属的种或属：槭属

培育人：颜立红、田晓明、向光锋、蒋利媛

申请人：湖南省森林植物园

申请号：20140046

申请日：2014 年 3 月 27 日

说 明：该品种常绿乔木。树皮灰褐色或灰黑色，小枝圆柱形，无毛。叶革质，披针形，长圆披针形或长圆倒披针形，长 7-11cm，宽 2-3cm，全缘，基部楔形，先端锐尖；侧脉 4-5 对，在下面显著；从深秋至春初，叶为红色或深红色；叶柄长 1-1.5cm，细瘦，无毛。花杂性，雄花与两性花同株；萼片 5，紫色；花瓣 5，白色，倒卵形，略短于萼片；雄蕊 8，无毛，长 5mm；小坚果凸起；翅与小坚果长 3-3.4cm，宽 8-10 mm，张开成钝角；果梗长 1-1.5cm，细瘦，无毛。花期 3-4 月，果期 9 月。该品种从深秋至春初，小枝和叶均变为红色或深红色，而原种在该时间段小枝为褐色，叶为绿色。

相似品种比较最主要的几个不同点。

品种名称	小枝（从深秋至春初）	叶（从深秋至春初）
冬韵	红色或深红色	红色或深红色
红翅槭	褐色	绿色

申请品种尚未公开销售。

丹霞含笑

所属的种或属：含笑属

培育人：曹基武、刘春林、郭超、赵翔、徐永福

申请人：中南林业科技大学

申请号：20140047

申请日：2014 年 4 月 1 日

说 明：常绿小乔木，小枝绿色，老枝灰褐色，芽、小枝、叶柄、苞片和花梗均被锈褐色绒毛。叶革质，椭圆形，先端急尖或尾尖，基部宽楔形，上面深绿色，下面黄绿色，叶柄上托叶痕的相对长度为叶柄长 1/5-1/3。花常单朵簇生叶腋，偶见 2 朵；张开呈杯状，芳香；花被片 6，紫红色，倒卵形，长 3.2-3.7cm，宽 1.6-2.1 cm；雄蕊 70-75 枚，长 1.5-1.8 cm，紫红色，雌蕊群淡绿色，圆柱形，心皮密被有光泽的红色微毛；开花期 3 月下旬至 4 月中旬，未见结实。

申请品种与父母本紫花含笑与醉香含笑比较的不同点为：

性状	丹霞含笑	紫花含笑（母本）	醉香含笑（父本）
习性	常绿小乔木	常绿小乔木	常绿乔木
叶质地	革质	薄革质	革质
叶形状	椭圆形或倒卵状椭圆形	椭圆形或倒卵状椭圆形	倒卵形
叶片大小	长 11.5-14.5 cm，宽 4.5-5.5 cm，先端急尖	长 6.5-7.5 cm，宽 2.8-3.5 cm，先端短渐尖	长 9.5-11.5 cm，宽 4.5-6.5 cm，先端渐尖
叶柄托叶痕	为叶柄长 1/5-1/3	达叶柄顶端	几无托叶痕
花	很多，常单朵簇生叶腋，偶见 2 朵；张开呈杯状	常单朵生于叶腋，偶见 2 朵；张开呈杯状	较多，常 1 朵生于叶腋，偶见 2-3 朵；完全张开
花被片	6 片，紫红色，倒卵形,长 3.2-3.7cm，宽 1.6-2.1 cm	6 片，紫红色，椭圆形，长 1.8-2.1cm，宽 0.8-1.2cm	9 片，乳白色，匙状倒卵形或倒披针形，长 3-35cm 宽 1.5-2 cm
花径	3-4 cm	1.4-1.8cm	3-5cm
花期	3 月下旬-4 月中旬	3 月下旬-4 月中旬	1 月下旬-3 月中旬

结实	未见结实	9月中旬，结实少	10月中旬，结实多
生长速度	中等	慢	快

申请品种尚未公开销售。

玉霞含笑

所属的种或属：含笑属

培育人：曹基武、刘春林、吴毅、郭超、赵翔

申请人：中南林业科技大学

申请号：20140048

申请日：2014年4月1日

说明：常绿小乔木，小枝青绿色，老枝灰褐色，芽、小枝、叶柄、苞片和花梗均被灰褐色绒毛。叶革质，椭圆形或倒卵状椭圆形，先端急尖或尾尖，基部近圆形或宽楔形，上面暗绿色，叶背被褐色，叶柄上托叶痕的相对长度为叶柄长 1/2-1/3。花张开呈盏状，花被片 9-12，乳白色转黄白色，倒披针形，长 3.2-3.5cm，宽 1.2-1.8 cm；雄蕊 60-70 枚，长 0.7-1.1 cm，白色，雌蕊群黄绿色，圆柱形；开花期为 3 月下旬至 4 月中旬，暂未结实。

其申请品种与父母本云南含笑与醉香含笑比较的不同点为：

性状	玉霞含笑	云南含笑（母本）	醉香含笑（父本）
习性	小乔木	灌木	乔木
株形	长椭圆形	圆球形	长卵球形
叶质地	革质	薄革质	革质
叶形状	椭圆形或倒卵状椭圆形	狭倒卵状椭圆形	椭圆形或倒卵形
叶片大小	长 10.5-12.5 cm，宽 4.5-6.5 cm，先端急尖	长 3.8-6.5 cm，宽 1.8-2.8 cm，先端钝圆或短急尖	长 9.5-11.5 cm，宽 4.5-6.5 cm，先端渐尖
叶柄托叶痕	为叶柄长 1/2-1/3	叶柄长的 2/3 以上	几无托叶痕
花形	盛开呈盏状	张开呈倒卵形	盛开呈杯状
花被片	9-12 片，乳白色转黄白色	6-12 片，白色，	9 片，乳白色
花径	4-5cm	2.5-3.4cm	3-5cm
花期	3 月下旬-4 月中旬	3 月下旬-4 月中旬	1-3 月
结实	未见结实	9 月中旬，结实少	10 月中旬，结实多
生长速度	中等	慢	快